




*Arrested collection of
Gemmatales from the
Tate Creek area of Arkansas
U.S.A.*

UN-

Mr. (or) Mrs.
1981.




FOLIO
QK97
M43
1775

AFBEELDINGEN
VAN
Z E L D Z A A M E
G E W A S S E N,

D O O R


NICOLAAS MEERBURGH,
HORTULANUS VAN DEN KRUIDTUIN
VAN 'SLANDS UNIVERSITEYT
T E L E Y D E N.




Mo. Bot. Garden,
1897

T E L E Y D E N,
By JOHANNES LE MAIR,
M D C C L X X V.
1775

(B700)





V O O R B E R I G T.

M. V., zoodat een' genuime tyd, voor zo verre myn
beroep soeket, gecoeffend hebbende in het afke-
kenen van alle Gewassen, welke my volkstaam voorkwamen,
en die ik door anderen niet of nauwlyks afgebeeld vond, over-
deckde ik niet omtrent te tyn, insogelyk te bepercen, of ik de-
schijn in platz soude boomen brengen, en, met hante na-
tuurlyke Collezen rassien, den Liefhebberen der Naturaal en
Kraak-kunde moede deelen; hier toe wierd ik niet weisig
ausgespoedt, dewyl de ondervinding my degelyk leende,
hoe moeilyk het is, een groot gant Plaatsen, tot hier toe niet
algemeen bekend, van elander en van anderoren te onderschei-
den, of schoon sy door den groten Litteratuur, en anderen be-
zoende Kraakkundigen moeberig beschreeven tyn, ten ty-
men de Brichkryvingen met de Afbeeldingen vergelykt; be-
quaamer gelegenheid, dan ik degelyk heb, los sich ook niet
opdoen, daar de Kraaktuin deser Universiteit, die voor gants
andere in Europa behoert te wylzen, een groot gant Plaatsen

V O O R S E R I G T.

bevat, welke men in vele Tuinen vroegelijc werde zicken,
en schone door den Heere Lintur, volgens de oorelegodesche
Beschryving van den Hooggeleerde Heere D. v. Royen,
opgegaaren, egter aergear, zoo veel my bewust is, behoor-
lyk afgebeeld syn.

Hier enste Tienal, welk ik so den Kruiklaadigen aankie-
de, sal alwayen, hoe ik gelugt ben in dit werk, alleen niet
hulp tot de Kruiklaade, en geraad tot eenig ander orga-
nisch, codemoozen, terwyl ik hoop, soo het zelvige
goedkeuring mag wegdragen, daar ic van eyd tot eyd voort-
gaan.

De namen der Gewassen heb ik van Linnaeus ondervet,
en my op derselue Werken teliken beroepen: dus bin ik ook
in werk gegaan met de Kappelles, welke ik op elke Plaet
zoo eenige Oekens afgebeck heb, en die alle uit myn Ver-
zameling ontlenen syn.

IASMINUM (*Grandiflorum*) TAB. I

IASMINUM (*Grandiflorum*) foliis oppositis planis; foliis extensis confusim. Linn. Sp. pl. p. 3.

IASMINUM (*Grandiflorum*) hispanicum magno flore exterse rubescit. Linn. Mantid. vi. pag. 316.

PAPILIO (*Helenus*) TAB. I

PAPILIO (*Helenus*) alis cruxis nigrae: posticia macula alba: fabae uribus albidiis hirsutisque septem ferruginea. Linn. Syl. Nat. pag. 745.

HEDYOTIS (*Herbaceus*) TAB. II

HEDYOTIS (*Herbaceus*) foliis licosi-hastatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. Linn. Sp. pl. pag. 142.

PAPILIO (*Polydorus*) TAB. II

PAPILIO (*Polydorus*) alis densatis nigrae fascia interrupta flava, posticia fabae macula linearibus licoso: rubra. Linn. Syl. Nat. pag. 745.

SALVIA (*Paniculata*) TAB. III

SALVIA (*Paniculata*) foliis oblongo-concavis immissis denticulis rotundis, caule frutescente. Linn. Syl. Nat. (2) Mantid. pag. 25.

PAPILIO (*Polydorus*) TAB. III.

PAPILIO (*Polydorus*) fibrae costipetæ; basi ala super
fascia base à macula parallela figurata; posticatum marge
fibrae macula ; laceribus , fasciis () Coccinea.

COMMELINA (*Africana*) TAB. IV.

COMMELINA (*Africana*) costis levigatis , foliis
incoeratis glabris , caule decumbente. Linn. Sp. pl. p. 40.

PAPILIO (*Troides*) TAB. IV.

PAPILIO (*Troides*) ala caudis nigra; primoribus panibus
marginibus pallidis; posticis fibrae macula fulvi. Linn.
Syl. Nat. 141.

HYOSCYAMUS (*Phytolacca*) TAB. V.

HYOSCYAMUS (*Phytolacca*) foliis ovatis integrifinis,
ciliatis inulis fuligineosis. Linn. Sp. pl. p. 158.

PAPILIO (*Machaerina*) TAB. V.

PAPILIO (*Machaerina*) ala oblonga integrifinis effigiis
nigro-nervosis; primoribus macula duabus nigra marginata. Linn. Syl. Nat. 154.

DAIS (*Cornifolia*) TAB. VI.

DAIS (*Cornifolia*) Linn. Sp. pl. pag. 556.

PAPILIO (Piers) TAB. VI.

PAPILIO (Piers) alis oblongis imagerimis albis nigro-servatis: primocibus maculis duabus nigris marginatis. Linn. Syst. Nat. 754.

MARTYNIA (Longifora) TAB. VII.

MARTYNIA (Longifora) caule simplici, foliis orbicula-tis repandis. Linn. Syst. Nat. (2) 412.

PAPILIO (Troilus) TAB. VII.

PAPILIO (Troilus) subru coarctata. Linn. Syst. Nat. 746.

SELAGO (Tomentos) TAB. VIII.

SELAGO (Tomentos) racemis paniculis, foliis ovatis crenatis tomentosis caule prostrato. Linn. Sp. pl. p. 877. n. 7.

MANULEA (Tomentos) TAB. VIII.

MANULEA (Tomentos) foliis concavis, crinitis foliis, pedunculis multilateris. Linn. Mantill. 11. pag. 420.

PAPILIO (Paeonia) TAB. VIII.

PAPILIO (Paeonia) subru coarctata alis quadratis nigris concoloribus omniibus marginis muricatis; politis foliis maculis superemis alba. Linn. Syst. Nat. 746.

CROTON (Lobatum) TAB. IX.

CROTON (Lobatum) foliis interni - ferentis: inferioribus quinque lobis; superioribus trilebis. Linn. Sp. pl. p. 1417. Nostri species semper habet folia trifida, et omnes pilosa.

PAPILIO (Demophoon) TAB. IX.

PAPILIO (Dymothes) als denaria: supra fascia viciis fibrae griseo-nervosae. Linna. Syst. Nat. 75).

IMPATIENS (Capaneus) TAB. X.

Plana annua, sibi die late credens, ad plurimam quatuor pedem, caeruleo luteo rubefacta, geniculata, foliata; ramis alterius varia, flores luci iuxta rubeo maculati;
Habens Impatiens Dali - nigrum.
Habens ad Prometheum Bonae. Sp.

PAPILIO (Scolaris) TAB. X.

PAPILIO (Scolaris) als inogeninis, primis supra fascia lateraque dilatato transversali: interioribus nigris, palliis albo coeruleoque praedita.
Alegundi et in ione. Abdomen & Corpus nigri, ale primis supra fasciis inogenitis transversali per medium. Subris margo niger ad medium alii fulvi, exteriorum ali flavi, fascia per medium angulis transversali nigro terminata: ale secundarie ad abdomen supra fascie, carenti nigri, velutina calvioribus partim, aere, maculis albis coeruleofasciatisque spotis irregularibus varie, fibris flavis, versus marginem fulci, per medium transversa fascia flavis nigro-circumscripta ornata, quo colores religiose ali paginula est. Versus marginem superiorem viciis flavis ornata & ad basim postbasim venis concoloribus, super ante fasciam ecclesie genitrix nigris cruxpunctis.

VERONICA (Hispania) TAB. XI.

VERONICA (Hispania) spicis terminalibus, foliis fibroso-punctatis - strob. dentatis. Planta perennis. Caulis filiformis, quasi foliis oblongo-ovalibus squamulis, sublinearis, - acuto punctato-dentata: denticuli divergentes recurvati, ad summum quandoque tenui, quandoque obtusissimi nulli.

Corolla tubulosa, cibis longitudinem calycis sequens, laeviuscæ corollæfrenus, flaminia brevioria, anthemis violaceæ.

Habitat in Hispania.

PAPILIO (Demophæs) TAB. XI.

PAPILIO (Demophæs) als dentata: super signis fulvis viridis, foliis griseo-marmoratis Linn. Syl. Nat. 733.

CELASTRUS (Locidium) TAB. XII.

CELASTRUS (Locidium) foliis ovalibus rotundis integerrimis marginatis Linn. Syl. Nat. 181. Mantill. 43.

Habitat ad Cap. B. spci.

Fructus eretox: Ramis fulvis, decidit; folia alterna, ovata f. obovata, obtusifolia, venosa, incisa, brevissime petiolata, margine integrâme refixa.

Pedunculi axillares, conferti, simplices folio breviorum.

Petala concreta, flamina corollæ breviorum, stylis cordatis, ligata via divergenda.

PAPILIO (Demodæs) TAB. XII.

PAPILIO (Demodæs) als dentata fulcis: maculae fuligineo-graculata flavis; politis ocellis binis. Linn. Syl. Nat. 733.

AMARYLLIS (Endelium) TAB. XIII.

AMARYLLIS (Endelium) spatha multiflora; Corolla

In penins., genito cedatia macroptera habet dilatata.
Habens ad Prometheum Bonas Spec.

Scopa cum umbella magnitudine umbellae cum pedunculo
genitali rotunda. Spatha profert cinctus 18. flora purpu-
roca; petalis angusto-lanceolatis, apice velutina mucrono-
ta; habet ipsa crux, flaminis decliviam. Linn. Syl. Nat. 217.

PAPILIO (Hebe) TAB. XIII.

PAPILIO (Hebe) ab integrinoris rotundis floris ex-
cuso signo: Geggis fibrae penitus pallidis rameolilinis
Linn. Syl. Nat. 363.

BROWALLIA (Elsa) TAB. XIV.

BROWALLIA (Elsa) pedunculis unifloris multifloris
qua. Linn. Sp. Pl. pag. 48a.

Habens in Peru.

Serrulata B. dentilla, sed caulis duplo major, rigida,
cratice dimidiū digit., quasi fructicosa; Rami inferiores
longioribz fere ipsius cratibz, quod non in dentilla.

Folia Borealis huius fere glabra. Pedunculi sibi usitatori, ali-
mifoci, quibusquod & vim, coquit fuscato escandens
victores, nec dilute viciace.

BROWALLIA haec est similissima B. dentilla, diffinita
tamen ab ea caule foliis quasi ligatis. Linn. Mant. (1)
431.

PAPILIO (Ulysses) TAB. XIV.

PAPILIO (Ulysses) fibrae conspicua. Linn. Syl. Nat. 242.

BROWALLIA (Dentilla) TAB. XV.

BROWALLIA (Dentilla) pedunculis unifloris. Linn. Sp.
Pl. pag. 479.

PAPILIO (Demophon) TAB. XV.

PAPILIO (Demophon) fibrae conspicua. Linn. Syl. Nat. 251.

GY-

CYTISUS (*Athiopicus*) TAB. XVI.

CYTISUS (*Athiopicus*) racemos: lateribus rigidis, ratis
angulis, foliis caulinis: Linn. Sp. pl. p. 142.

PAPILIO (*Scelia*) TAB. XVI.

PAPILIO (*Scelia*) ali: subintegerrinis revolutis fabris:
primoribus super aliis fundo nigro; subros paucis ne-
bulosis. Linn. Syst. Nat. 763.

CROTALARIA (*Quinquefolia*) TAB. XVII.

CROTALARIA (*Quinquefolia*), foliis quinquef. Wellis-
tandis: corni. Rheod. nat. p. p. sc. t. 28. fig. multa.

Folia angusti: lanceolata, oblonga, sepe renata, subcordata
lateribus brevioribus, calyx campanulata. Flores ince-
moi sterni glabri. Linn. Sp. pl. pag. 100d.

Obl. In nostra planta folia una sunt simplicia; paulo altera
sunt ternae, adhuc quo alio sunt quaternae sunt, do-
nec supraem quinquefida exiliunt; unde nivis: nomen
Cl. Linnosus defunplex.

PAPILIO (*Melpomene*) TAB. XVII.

PAPILIO (*Melpomene*) ali: oblongis integerrinis nigris:
primoribus fabria rubra; postea bei fabria penitus fa-
gina. Linn. Syst. Nat. 758.

BALTIMORA (*Rubra*) TAB. XVIII.

CHRYSANTHEMUM Americanum, caule alto, am-
plioribus foliis binatis, deribus pallide luteis: foliis par-
vis. Pick. mast. 46. t. 342. f. 3.

Habuit in Marylandi, ad urbem Baltimore. O. H. U.

Caulis bipedalis, terges: croctus, vixidus: lateribus pro-
funde canaliculatus: angulis: fabris: rati laterales hor-
ribilis.

Folia oppositæ, petiolata, ovata, acuminata, formæ, visceris,
vix, paucis, lobato-cordata, pila levigata, fedice;
capitulis scabra.

Pediculus terminalis, parvus, floræ loci. Corolla diki
concreta æquale signis. Linn. Massill. (2), 212.

PAPILIO (Philiodes) TAB. XVIII.

PAPILIO (Philiodes) siccæ fibroso-rotunda foliæ; pediculis ocelliæ
in distans exsertis papilla nigra parvula; cella alba.
Linn. Syl. Nat. 750.

Alio Primrose, foliæ falcis laceri alba & linea transversa
sit basi: Pediculus parvulus. s. albæ & macula 1. violacea.

COREOPSIS (Laciniaria) TAB. XIX.

COREOPSIS (Laciniaria) foliæ laciniolatae, irregulatim
ciliata. Linn. Sp. pl. pag. 123.
Quæ in nobis plantæ foliæ intima super terram evanescunt.

PAPILIO (Aenea) TAB. XIX.

PAPILIO (Aenea) siccæ dentatae eritis petiolatis supra marginis
viridi; pediculis nascens palpus fringuis. Linn. Syl. Nat. 747.

LOBELIA (Minuta) TAB. XX.

LOBELIA (Minuta) foliæ radicibus ovalis fuscis capillaris.
Habita in cap. b. sp. foliæque 2.

Planta minuta (ad Cameraria & Bellum odontatum) petiolata.
Radix filiformis prospargibiles rotunda. Folia radiculæ, elevatae,
obtusa, emarginata, vix crevata, longius petiolata. Scapo
fasciculatus, bipaniculatus, erectus, apicalis, villosus. Cy-
lindrus oblongus, lanceolatus, crenulatus; Corolla infundibularis.
Cephalia latera oblonga. Affinis Lobelia Lan-
tanae sed rarer, nec ultra besides in capa, a L. Erigo
differt cuncta nulla. Linn. Massill. (2) 192.

PAPILIO (Ulysses) TAB. XX.

PAPILIO (Ulysses) siccæ dentatae distans exsertis
maculis; pediculus foliæ ciliæ separe. Linn. Syl. Nat. 748.

BOERHAVIA (Scandens) TAB. XXI.

BOERHAVIA (*Scandens*) caule cruce foliis diametris,
foliis cordatis scorpiis.
Caulis 4. pedalis, striatus, rugosus, levigatus,
Folia cordata, glabra.
Umbellae floriferæ involucrum 5. phyllo, deciduum.
Corolla diandra, viridefusca Linna. Mansill. (2) 315.
Valerianella curassavica, feminæ spuma viscosa.
Plat. alin. 349. t. 113. f. 3.
Solanum hirsutum americanum, fructu corymbosa.
Plat. alin. 349. t. 216. f. 3.
Propterum hirsute binis lacinia Plinnetii huic speciei Cl. Lin-
naeus applicavit. Prior male depicta a Plinnetio; posterior
eiam plantam exhibet.
Nofra species semper habet umbellas multifloras.

PAPILIO (Thea) TAB. XXI.

PAPILIO (*Thea*) alis cordatis: super nigris: fasciis du-
abus flavis interrumpitis, subante flavo fascia exculta. Linna.
Mansill. (2) 336.

ANAGALLIS (Lutifolia) TAB. XXII.

ANAGALLIS (*Lutifolia*) foliis cordatis amplescasadibus,
caulinis compatis. Linna. sp. pl. 222.
Crucina moneta minor flore coeruleo-flav. ic. 514. f. 2. nobis.

PAPILIO (Ricini) TAB. XXII. Mus. & Persina.

PAPILIO (*Ricini*) alis oblongis intergeminis fasciis: prima-
tibus strigisque fasciis dubitis flavis. Linna. Syst. Nat. 736.

SAXIFRAGA (Solenifera) TAB. XXIII.

Folius oppositi - rosulatis, dentatis, crassis palmoribus fab-
rii rufis cassis dentis flore: capite aphylio.
Cul. perifolii monophyllus, 5. parvus, punctatus, lacinia
ovatis acutis cibis: superioribus microscabis.
Cor. irregularis: 4. pedalis, pentaphylla, petalis rubens super-
ioribus ovatis fimbriatis, planis, maculis roatis inferioribus
dubius deflexis, triplo majoribus, annulatis niveis: re-
ctae, cornuta glandulosis.
Stam. fil. decem filiformia asthetes parve bilobis ciliatis.
Pist. genn. duo ovaria, stylus dux, ligamentum parva obtusa.
Habitat in Virginia.

PAPILIO (Polymeria) TAB. XXIII.

PAPILIO (Polymeria) sicc oblongi integrerimis luteis; primoribus foliis raro; politis foliis rarer signis. Linn. Syst. Nat. 775.

RIBES (Cerasiferi) TAB. XXIV.

RIBES (Cerasiferi) scuticis fibrocellularibus, barbis aculeatis racemosis. Linn. Sp. pl. pag. 192.
Folia R. Uva ciliata, folia parva lata. Aculeis inter spinae lobis sicc Pedunculi fructus villosi. Germin. intus hirsutum, nec aculeatum. Corolla R. Cerasifoliae bacca magnitudine max. oxylii similius utramque scuticis rebosis.

PAPILIO (Papilio) TAB. XXIV.

PAPILIO (Papilio) sicc oblongi integrerimis fulcis; primoribus foliis rarer; politissimis dubius hyalium. Linn. Syst. Nat. 774.

PAEONIA (Tenuifolia) TAB. XXV.

PAEONIA (Tenuifolia) foliis linearibus multiparitis. Linn. Sp. pl. pag. 748.

Radix rugosa. Folia Delphinii grandiflori S. Anthora, signa decomposita multipunctis in lucinis cutharcis, luceis levibus. Flos terminalis R. officinalis sed minus, pedunculato foliatus. Cauda neque ramosa. Verbo qualis Flora Paeonia, ex Adoniside speciosa.

PAPILIO (Papilio) TAB. XXV.

PAPILIO (Papilio) sicc nigra sicc fibrocellula profilo contracta; politis foliis luteis basi cruentata. Linn. Syst. Nat. 773.

SIDERITIS (Hirtum) TAB. XXVI.

SIDERITIS (*Hirtum*) foliis lanceolatis obtuso dentatis pilosis, brachis dentato spinosis, caule hirsuto, spiculis interrupitis elongatis. Linn. Sp. pl. pag. 803.

Caulis rigidus, pilosus, folia lanceolata, oblongo-attenuata, rufo-plicata, serratis 3. 5. 4. foliatis. Brachia cordata ferrato-spinosa. Venticilli remotissimi; foliis, floriferis, caule inter veniculos hirsutore. Corolla flora tubo incravo; Labio superiore lacinia, semibifida, reflexa, erectio, niveo L. inferiore minimo, calyxca binis, spinis 5-angulis, summa linea rubrum.

PAPILIO (Ochreus) TAB. XXVI.

Ait postea rorundatis subdigrediatis, omnibus nigris uniusque fascia basi cinctius flavo inferioribus maculatus, vultu coloratus. Centrum omniem alorum occupat fascia cordata his, amoenam leviorans, ali se quinque supra series binis margini parallelis ex macula basalis cordiformibusque floris infra ali secundarie ab articulo usque ad medium flava, ceterum ante feribus, tribus, parallelis margini ex macula cordiformibus, ac basulari; harum prior series rubro tincta, media cerasina & extremo flavo est, reliquum corpus & ali nigerrimo colore uniforme.

SIDERITIS (Purpurea) TAB. XXVII.

SIDERITIS (*Purpurea*) herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus implexicordatis Linn. Sp. pl. pag. 804.

Caulis erectus, herbaceus, Folia inferiora caulis petiolata, superiora sessilia, opposita, implexicaulia. Floralia cordata, integerrima, sciamissata; corolla alba venis aliquot rubra.

PAPILIO (Ecklon) TAB. XXVII.

PAPILIO (*Ecklon*) ali bisetariae supera fuscis; subtus pallescensibus; fuscis rotulaque terminali tubo. Linn. Sp. pl. Nov. 788.

SIDÉRITIS (Linn.) TAB. XXVIII.

SIDÉRITIS (Linn.) foliis cordatis obsoletis villoso, cylindrica rotundata, longa, spica longa, cyme cymosa. Linn. Syt. pl. pag. 94.

Planta spathacea, erecta, rara, lusitana. Cauda simpliciflora. Petioles cordata, latifolia, oblonge crenata, obsoleta, spica longior ipsa cauda, foliis, terminalia e Vorticella ferulina, renata, valde lusitana. Corolla annulata, longior cylbris, bractea crassa, oblonga levata, latata.

PAPILIO (Coryssper) TAB. XXVIII.

PAPILIO (Coryssper) alis integreratis fulvis marginis aliquo punctis alba, pollicis disco penulis nigra Linn. Syt. Nat. 74.

LOTUS (Arabicus) TAB. XXIX.

LOTUS (Arabicus) leguminibus cylindricis aristatis, caulis protractis, pedunculis trifloris, bracteis acanthophyllis, Linn. Mant. 104.

Pedunculi primi usitati fusc.

PAPILIO (Tenuer) TAB. XXIX.

PAPILIO (Tenuer) alis fabrepandis lividisticulis, subreticulatis; pollicis ocellis tribus: postremo maximo. Linn. Syt. Nat. 75.

BALTIMORA (Abo) TAB. XXX.

Cauda alata decolorata foliis oppositis lato lanceolatis pendiculatis excurrenti ferraria,

Crocoena ad 8. pedum altitudinem Coecopis sternitulum simulans.

Habens in amictis suppositiones.

PAPILIO (Orelius) TAB. XXX. Schous confusa.

ARALIA (Nodifolia) TAB. XXXI.

ARALIA (Nodifolia) caule nudo, foliis binis ternatis
Linn. sp. pl. pag. 323.

Christophorus, Virginum varie radibus circulatis & fun-
gois. Plut. abr. 96. t. 238. fig. 9. fig. multa.

PAPILIO (Eupope) TAB. XXXI.

PAPILIO (Eupope) ali oblongo integrerrimus aligis albo-
punctatis luteis loba, Linn. Syl. Nat. 736.

TRADESCANTIA (Crispa) TAB. XXXII.

TRADESCANTIA (Crispa) ramosus levius spathis diphylli-
es imbricatae. Linn. Syl. Nat. 3. pag. 233.

Concentrica cristata sp. pl. pag. 44.

Radix aquosa, caules erectos, levos, ramosi, diffusi, repen-
tes, folia lanceolata recessans, levia, basi vaginata, va-
gina striata, spatha intercalata, diphylla, biloba, forni-
bus ciliatis, levana, scapularium, secunda Cal. corolla
brevior. Petala 3. orata, suffusa, curvula filamentu pilo-
fi erunt; pili canulae sessiles. Stylos clavis digita
tuberculata, crenatum.

PAPILIO (Agaor) TAB. XXXII.

PAPILIO (Agaor) ali dentatis nigrae basi fuscopurpurea: pri-
maribus fibratis; pollicis disco albo maculis nigra. Linn.
Syl. Nat. 747.

OENOTHERA (Fruticosa) TAB. XXXIII.

OENOTHERA (Fruticosa) folia lanceolata subdecurrentes,
capillis pedicellatis acutangulis, racemo pedunculare
Linn. sp. pl. p. 451.

Calyx purpureo-crenatus, semiphylla, sed rumpitur altero fe-
nix & unico labore. Tuba ciliformis, angustiflava,
capilla angulis 4. rectis compresilla folia sericea despi-
culata.

PAPILIO (Cardamines) TAB. XXXIV.

PAPILIO (Cardamines) ali integrerrimus rotundatus aliis;
primordia medio fulvis; pollicis lobus vindi nebulosis
Linn. Syl. Nat. 761.

OENOTHERA (Parviflora) TAB. XXXIV.

OENOTHERA (*Parviflora*) foliis orno-laceratis platis, capite leviter tuberculata. Linn. sp. pl. pag. 492.

Fratellus spec. coronariae mentitur officio, nec quadrifido, nisi OE. bicoloris, cui similior. Calyx pars adsparsa, sed abique tuberculata ad coram hanc. Petala respondentibus, minus molles. Calyx tubo suo quadriplanteior, inter apicem dentis et rotundum, hinc ante cappingionem recessores in hac distantea Petalarum latera dilatata, dimidio minoru precedenter petalum.

Capitulum quadrivalve.

PAPILIO (Marfum) TAB. XXXIV.

PAPILIO (*Marfum*) ali bicoloris fuga carmine; fabae cornutissimum penitus negra. Linn. Syst. Nat. 781.

OENOTHERA (Longiloba) TAB. XXXV.

OENOTHERA (*Longiloba*) caulinis simplicibus pilosis, penitus dilatatis blattis. Linn. Mant. 2. 223.

Folia Radicula numerosa, lacerata, dentata, petiolata costa alba, oblique nervosa.

Calyx frigus 3., eni infra folia radiculis, simplicissimi, adfrondosus, litti, viridis, pila longis, postea albis.

Calyx centralis scutis excoecata.

Petala caerulea crassa oblonga, dentata, scutis, radicibus scutis.

Florus uniflorus superiorum foliorum, gemmato calycoque piloso.

Calyx tubo insigniter elongato, limbo suo triplo longior.

Petala 4, flora, obcordata, biloba, magnitudine OE. eque, si non majora, lateribus diffinata; altero die rubra.

Fratellus familia OE. ussuricus, sed longior, inferne angustior, ore coquente missurabre.

Differ ab OE. ussurica, que foliis caulinis Johnsoni, tuberculatis, cuncte eructo, ramis laureolibus, via manifeste pilosis. Petala approximata, via emarginata, nec bilobis; calycis tubo via latiora duplo longior.

PA-

PAPILIO (Dido) TAB. XXXV.

PAPILIO (*Dido*) alis densis oblongis nigris viridi maculatis, postice luteis maculisque superum transversis crenulatibus. Linn. Syl. Nat. 382.

SAPONARIA (Pterigaea) TAB. XXXVI.

SAPONARIA (*Pterigaea*) calycibus cylindricis pubescens, sumis divaricatis, fructibus pendulis. Massell. (1) p. 239.

Silene pungens Syl. 3. p. 130.

Lycosa chalcensis natus, foliis perutu hirsutis angustis, foliis carneis, pedicella indumentis bluescitibus capitulo fere rotundis Moris. Hall. 3. p. 541. fig. mab.

Caulis bipinnatus, eretrix, armillatus, rigidulus, inferne glaber, supero pubescens viscidus raro divaricatus. Folia lanceolata: inferiora glabra; superiora sub rufulis annulis pubescens viscida.

Pedunculi stellares, foliis uniflori, capillares, hirsuti patentes glabri, longioribus foliorum, dum fructiferi penitus.

Calyx oblongus, tubulosus, pubescens-viscidus.

Petalum subapice rotundatum, subacutum, emergente loculis brevibus Stom. alba, tubo leviorum, German. custom. Syl. diffinita.

Silene ampliata.

Ob. Deleatur inter Silenes; fabritius haec descripsit a vix.

PAPILIO (Daphnis) TAB. XXXVI.

PAPILIO (*Daphnis*) alis irregulariter rotundatis albis marginatis fulvi. foliis lance griseis albo maculatis Linn. Syl. Nat. 760.

CODON (Royesi) TAB. XXXVII.

Cal. perianthium monophyllum, decempartitum foliatis tubulari, peribasibus cretibasculis: sternis brevioribus.

Cor. monopetala campanulata basi rotulata: Limbo decem partio exaequali. Nectarium decem loculare ex liquam 10, unigenito flaminum infertis, caeruleentibus, receptaculum segregatum.

Stam. diametra decem, longitudine corollae. Anthere crassae, Pill. German. superum corollam, stylis simplex, longioribus flaminum, ligatus deo, longi, leuca, divergentia.

E. 2.

Per.

Pter. bilobatum.
Sem. plana subcordata hinc in pulpa exfusci colores.
Cordia kirkiana, fenum, coerulea, rarae canis allergentibus, sola altera petiolam cordatam ovata, subrepanda, levigata, acuminata, subcoriacea glabra supra aerea;
Flora longa axillaris, foliarii, pedunculati, flosca corolla atropurpurea Bellidens albida, annua socii Ritis corporis et parvifloribus Herba cum adspicere dicit Royeri Linnaeus. Syl. Nat. 3. 292.

PAPILIO (Maripos) TAB. XXXVII.

PAPILIO (Maripos) (leibus costipennis) Linnaeus. Syl. Nat. 788.

THEA (Bohea) TAB. XXXVIII.

THEA (Bohea) Berberis hexapetala Linnaeus. Sp. pl. pag. 734.

PAPILIO (Hippocrea) TAB. XXXVII.

PAPILIO (Hippocrea) alia integrinim super falsis immundis; (dico circumscriptis) pedalis acutisibus membranosis. Linnaeus. Syl. Nat. 791.

SENECIO (Claryaceae) TAB. XXXIX.

Cordis aude foliis longioribus linearibus, prolongis.

Habitat ad Promontorium bene spesi.

Planta fructuosa berberis corymbosa, foliis, priore in plana justicis fuscis folia corticosa.

PAPILIO (Clio) TAB. XXXIX.

PAPILIO (Clio) alia oblonga integrinim fuscis: primis aliis membranosis: pedalis fuscis aliis Linnaeus. Syl. Nat. 751.

GORTERIA (Anemone) TAB. XL.

Folia integris dentatis splochois, amplioribus, ramis alternatis, berberis pedunculatis luteis foliis violaceis.
Habitat ad Promontorium bene spesi.

PAPILIO (Antilochus) TAB. XL.

PAPILIO (Antilochus) alia cordata concordioribus floribus: flosca marginoque nigra, caulis aliis longioribus aliis Linnaeus. Syl. Nat. 771.

CYANNELLA (Capensis) TAB. XII.

Cor. Hemisphaerica petalis 3. inferioribus propriocaducibus rotundis infunditum declinatum longior. Linn. Syst. Nat. 243.
Vides plute. phyt. 434. fig. mala.

PAPILIO (Polyxena) TAB. XII.

PAPILIO (Polyxena) alii canticis, super puerorum nigra,
alii prometheis, maculis albis duabus minimis fibris ne-
bulosis.

Habita in America.

SOPHORA (Tiafflesia) TAB. XIII.

SOPHORA (Tiafflesia) foliis vernatis subfalciformibus foliolis
obovatis glabris. Linn. Sp. pl. pag. 534.

PAPILIO (Ulysses) TAB. XIII.

PAPILIO (Ulysses) aliis canticis nigris disco coeruleo na-
dante; politis fibris ocellis septem. Linn. Syst. Nat.
742.

Alii primores sunt: a bufo ad medium macula cornuta se-
ptem-dentata: maculae 7 falcis lanceolatis parallelis in
parte sternae signa simili atra et cornuta intermixta.

ROYENA (Villoso) TAB. XIII.

ROYENA (Villoso) foliis cordatis oblongis fibris tenui-
scissis.

Serrulis Royena lucida sed rami villoso foliis ellipticis, oblon-
go, basi cordati fibris tenuissimis, oblongis, levigatis
pedunculis villosis, Flores axillares, unilaterales, foli-
arum pedunculis villosis longiori florum bracteis 2, op-
positis, ovata, acuta, pubescentes, calyx majoris co-
que subiecta decidua. Linn. Syst. Nat. T. 2. pag. 302.

Habita ad. cap. h. spci.

PAPILIO (Collins) TAB. XLIII.

PAPILIO (Collins) alia angelica dentata regia; primaveris ornatissima flosca mucolla corolla.

Magnoliaceae. Pap. Polychlorae.

Habitat in Asia: China.

LYTHRUM (Purshianum) TAB. XLIV.

LYTHRUM (Purshianum) foliis oppositis linearibus petiolatis, floribus dodecandra. Linn. Sp. pl. 642.

Anemone flore purpureo rubore ringens, gale bipartita labio quadruplicato fimbriatis valvulatis inclusa, caule rizomatice. Flores habent rizomatam & corymbo macrostachyam, manu formantem confertissimum Clavt. n. 418.

Folia lanceolata, opposita, integerrima, cordis pectinatis valvulatis flos ex fragula sive foliacea, calyx tubulatus, oblongus, verticillatus, ore oblate micans fructuosa. Petali sex, tensa oblonga. Stamina duodecim, sex ad flagitium lutea.

Polygonum unicolor. Stigma caputatum.

Cephaea media foliis oblongo-ovatis oppositis spiculis terminalibus Brown. Jan. 316.

PAPILIO (Philes) TAB. XLIV.

PAPILIO (Philes) alia integrifolius angelica dentata primaveris mucolla; pedicello herbo luteo Linn. Syl. Nov. 164.

TEURIUM (Oberseae) TAB. XLV.

TEURIUM (Oberseae) foliis ovatis incisis glandulis fabescens, floribus foliaceis pedunculatis Linn. Mandib. pl. pag. 82.

Habitat in cava humidiſſimis.

Caulis erector, glaber, indecurvus, Flores albi.

PAPILIO (Bice) TAB. XLV.

PAPILIO (*Dicer*) alis angularis fuscis, primoribus fuscis
fava: fabus nigro undulatis Linn. Syl. Nat. pag. 778.

ALYSSUM (Hyperboreum) TAB. XLVI.

ALYSSUM (*Hyperboreum*) foliis incisis decorsis, flami-
nibus quatuor bifurcatis. Linn. Sp. pl. pag. 910.

Loudia foliis ellipticis incoaditis dendritis Kraschen. 12.
Pet. 1747. p. 581. t. 15. fig. 1. mala.

Suntim s. berviora ungue scuto acutis, reliqua 4. ad ha-
bita squamae emarginata.

PAPILIO (Bice) TAB. XLVI.

PAPILIO (*Bice*) alis rotundatis fuscis habet viventibus:
pollicis fabos fuscis latere. Linn. Syl. Nat. 795.

Pap. Mal. sepe caudam.

OTHONNA (Taygetis) TAB. XLVII.

OTHONNA (*Taygetis*) foliis linearibus pinacis foliodes-
catis, caule herbaceo. Linn. Sp. pl. 1339.

PAPILIO (Phidias) TAB. XLVII.

PAPILIO (*Phidias*) alis rotundatis ante niveibus intryp-
ticis albit ore atque rubris. Linn. Syl. Nat. 795.

CINERARIA (Linifolia) TAB. XLVIII.

CINERARIA (*Linifolia*) pedunculis umbellis foliis spar-
so caule fructuosa. Linn. Spec. pl. 1344.

Corte frusticosa, compacata, rufa; folia cordiformia,
lanceolata angustifolia, viride pedunculis foliaceis, unifloris,
glaberrimis, foliis longioribus. Anemone. Acad. &c. etc.
fl. Flores parvi luci.

PAPILIO (Ares) TAB. XLVIII.

PAPILIO (Ares) sive angustis griseis: primoribus fore
centi nebulosis: supra ocellis fuligineis. Linn. Syl.
Nat. 169.

HELIANHUS (Argallifolius) TAB. XLIX.

HELIANHUS (Argallifolius) folia alterna linearibus
Linn. Sp. pl. 1479.

PAPILIO (Quercus) TAB. XLI.

PAPILIO (Quercus) sive fabicola: supra cornuta; fabi-
ca cornuta linea alta, puncto ari gemina fulvo. Linn.
Syl. Nat. 281.

LEEA (Oryza) TAB. L.

LEEA (Oryza) corte angusto foliacea. Linn. Mantill.
pl. 123.

Radix tuberosa, caulin foliiginea, rotunda, articulata,
tripedalis, angula membranacea crassa, Folia dista-
ta, pinnata, rachi marginata; foliis petiolatis 3. 1. 3.
ovali-oblongis, linearis, glabra anguste ferratis, nervis
transversis, levioribus 3ris transversis parallelis. Super-
ior foliacea, fabfolia, seminodata, carnis coloris. Pe-
dunculus corymbofici. Flores nigris exigui. Variae
specie. Nervi opposti sunt.


PAPILIO (Deyrolle) TAB. L.

PAPILIO (Deyrolle) sive domini fastis: primoribus u-
nitimque ocellis quinque; pollicis fore foliisque albo reper-
ta. Linn. Syl. Nat. 174.

TAB. I.




N. Neesburgi. Scit.



TAB. II.



N. Meertensi Laut



TAB. III.




N. Meambungl. Sect.


TAB IV.



N. Meerburgi fecit



TAB.V.




N. Meenburghl fecit




TAB.VI.




N. Membrungl. Sect.




TAB.VII.




K Heerburgi stat



TAB.VIII.



H. Meerburgh fecit



TAB. IX.




N. Meamberg facit




TAB.X.



Norfolkshire Flit



TAB XI



N. Meenborg fecit.



TAB. XII.



N. Meerburg fecit.




TAB XIII




N. Meerburgh fecit



TAB XIV




N. Meenburgh fecit



TAB XV




N. Meenburgh fecit



TABXVI



N. Meerburgh fecit



TÁB XVII




N. Meerburgh Leaf







N. Meenbung fest.




TAB X VIII.







TABXX




N.C. Meekings Felt



TABXXI



N. Maerburgi. fecit




TABXXII



N. Meenburgh fecit



TABXXIII



C. Mierburgh fecit



TABXXIV




N. Heerburg fecit.



TABXXV



N. Haerbulg feit




TABXXVI




N. Meenbungz. fideb.




TABXXVII




N. Meerburgh fecit



TAB XXVIII



N. Meesburgi fecit



TABXXIX



N. Meerburgh fecit




TABXXX



N. Meenborg fecit



TAB XXXI




n. Meirburgh fecit



TAB XXXII




N. Meesburg fecit



TABXXXIII



H. Meerbings fecit




TAB XXXIV




N. Koenigl facit



TAB XXXV




N. M. Neuburg fecit



TAB XXXVI




N. Meenborg scit



TAB XXXVII



N. Meerburg fecit



TAB XXXVIII



N Haenburgo fecit

11

12 13 14

15

16

17


18

19

TAB XXXIX



N. Meerburg fecit



IABXXXX



Dr. Neerburg fecit



TAB XXXI



N. Greenberg facit



TAB XXXII



N. Steenburg fecit



TAB XXXIII




N. Murbong feit

idly

TAB XXXXIV




N. Meurburg fecit




TABX LV



N Meerburgh fecit



TABXLVI




N. Meerburgh fecit



TABXLVII




N. Hennigl fecit



XLVIII



N. Meenburgh fecit



TAB XLIX




N. H. Burroughs

73

TABL




N Moorlinge fuit



Information to determine
length C weight



This book was released in soft-cover
exploring LP® content recording.
Richard C. Edler, Copyright
© 1990, February 1990





Afbeeldingen van Zeldzame, Onderworpen en belangrijke 1775

Synt

Fore

Top

Foot



